

正體

簡體

[站內資料庫](#)

【類別】：醫學病理 → 心理*醫學 → 精神科

線上諮詢

2204人觀看

回 精神科



延伸閱讀

[癲癇 - 診斷與治療](#)
[癲癇 - 處理方式](#)
[癲癇 - 病因](#)
[台灣癲癇之友協會](#)
[台灣癲癇醫學會](#)
[婦女與癲癇\(一\)](#)
[婦女與癲癇\(二\)](#)
[癲癇發作的種類](#)
[癲癇真假的鑑別](#)
[癲癇發作的處置](#)
[老年人與癲癇](#)
[關於癲癇](#)

最多瀏覽

[腦震盪](#)
[月經與懷孕](#)
[胃痙攣](#)
[胃脹氣與脹痛](#)
[痔瘡 內痔 外痔](#)
[香港腳防治](#)
[梨狀肌症候群](#)
[愛滋病](#)
[急性骨盆腔發炎](#)
[牙部疼痛](#)
[彰化世外桃源庭園咖啡](#)
[性病疣「菜花」新藥](#)

農委會授權-台灣
藻寡醣

連4年與學術界發表
表<褐藻糖膠保健研
討>,SNQ國家認證,養
生保健新希望!
望!...<詳全文>

癲癇發作的處置

癲癇發作是腦部不正常放電而造成手腳不自主運動、抽搐或神智不清。癲癇發作的時都是不可預期的，發作的表現也不盡相同，所以各種意外都可能發生，癲癇發作時可能產生的意外包括頭部外傷、燒燙傷、骨折、溺水、吸入性肺炎、窒息等。癲癇一旦發作不必覺得恐怖，也沒必要馬上想辦法壓制發作，一般發作頂多2到3分鐘，腦部自然有讓它停止的自然保護機轉，雖然病患發作時狀似痛苦，但是發作當時是不會有痛苦的，頂多有可能在發作後有一些酸痛。發作中若口中流出血多半是病患咬傷自己，可在發作完再處理。發作中呼吸不順也很常見，但時間也很短。必須強調的是癲癇對周遭的人並無危險，也不會傳染，對癲癇發作有以上一些知識就可以了解，癲癇病患發作時最須要旁人的幫忙，而不是驚慌失措或異樣眼光。當發現周遭的人癲癇發作時，我們應該給予何種協助？

抽搐形癲癇：

- 1.保持冷靜。
- 2.將病患附近尖銳物品移開，若有軟墊或衣物可墊在病患頭下。
- 3.病患口中若有食物或假牙將之掏出，若病患處於僵直狀況嘴巴無法張開，切勿把手伸入病患口腔內，或硬塞物品讓病患咬。
- 4.將病患臉側放，讓口水及分泌物流出，以免堵塞呼吸道。
- 5.陪伴病患至神智清醒，並告知發作的情況，並給予安慰。

何時應將病患送醫？

- 1、病患連續抽搐五分鐘以上，或連續發作間神智沒有回復。此為癲癇重積狀態須將病患快速送醫治療。
- 2、發作後病患抱怨身體有不正常疼痛，特別是有跌落在硬物上時。
- 3、癲癇發作中頭部有撞擊到硬物時。
- 4、發作後病患呼吸困難或胸痛。
- 5、身上有燙傷時。
- 6、發作後神智模糊是很常見的，但若時間超過一小時，建議送醫治療。

非抽搐型發作的處理：

將病患帶離有危險的地方便可，若手上握有尖銳物品或電氣用品，將之取走。觀察病人手腳的動作頭眼轉向何方，陪伴病人至神智清醒，並告知發作的情況。

坐輪椅病人發作時：

- 1、保持冷靜
- 2、將輪椅煞車固定
- 3、避免病患碰到周遭尖銳物品
- 4、發作完後，將頭轉向一側，讓口水及分泌物流出。
- 5、讓病患回到床上休息，陪伴至神志清醒。

水中癲癇發作時：

- 1.讓病人臉朝上，頭部盡量離開水面，下巴往上提，以保持呼吸道通暢。
- 2.儘快讓病人離開水裡。
- 3.上岸後讓病人側躺，檢查有無心跳呼吸，若無則馬上進行心肺復甦術並呼叫救護車。若心跳呼吸在上岸後很快恢復，仍需送醫作詳細檢查。

(以上文章感謝 尤香玉醫師提供)

※小叮嚀：投稿或引述文章內容請記得註明出處，以示尊重其著作財產權利，倘有疏漏之處也歡迎來信指教，謝謝。

[投稿信箱](#)
[補充意見](#)

奇力愛
Miracle Power Love

客制化營養餐

化療 放療 術後 老人



IKEA大玩驚喜新花樣

紙上家具動起來？超能透視APP？原來都在瑞典品牌IKEA今年的新型錄...<詳全文>



有話要說

共有 0 筆回應 · 合計 0 頁 · 正在第 0 頁

匿稱：

內容：

(1千字內) 請輸入驗證碼：



- 做為食療的話可能要很長期才會..
- 沒想到草莓也有此效用感謝分享..
- 我聽說是沒有徵兆的..



本站入圍衛生署95年度優良健康資訊網站

台灣醫療網 版權所有

© 2006-

2012 TW16 Network! Taiwan Inc. All Rights Reserved. 客服信箱